




강화와 저어새

Black-faced Spoonbill, Ganghwa



동아시아에 제한되어 분포

번식지


한국, 북한, 중국, 러시아

월동지

대만, 중국, 일본, 홍콩, 제주도, 베트남, 캄보디아, 필리핀

• IUCN Redlist

심각한 멸종위기종(1994-1999) → 멸종위기종 (2000 ~ 현재)





2015년

13개 번식지에서 약 800쌍 번식함 → 전체 번식개체군의 80% 이상



요도



석도



비도



상여바위

각시바위





총면적 400m²





흰색에 적갈색 반점이 산재

한배알수 - 2~4개

포란기간 - 24~26일

수컷은 주로 낮에

암컷은 밤에 포란함

교대횟수는 먹이터와의
거리가 영향을 미침





부화 간격 - 1~2일 / 암수가 함께 육추 / 새끼의 부리는 점점 검게, 그리고 넓적해짐



부화 후 약 35일이 지나면 날기 시작

이소 후에도
부모를 따라다니는
경우가 있음



5-23 4:50:56 PM M 1/3





취식지(갯벌, 논) 여건이 좋음, 다양한 휴식지 존재, 가을철에 많은 개체가 집중.

취식지(갯벌, 논)의 여건이 좋고, 다양한 형태의 휴식지 존재



전체 개체의 약 45%가
강화지역에서 확인됨

번식기 뿐만 아니라 가
을철 이동시기에도 이
용률이 높음

월동지로 이동하기 전
에너지를 축적하기에
안정적인 서식지임

